



## Riesgos

Los riesgos a corto plazo son dolor, eritema (enrojecimiento), hematomas, inflamación que generalmente remiten en poco tiempo, sin necesidad de tratamiento. Es conveniente evitar el tomar anticoagulantes y vitamina E los días previos a la infiltración.

Reacciones alérgicas, hormigueos, blanqueamiento transitorio de la piel, nódulos, reacción granulomatosa, infección y herpes, que requerirán tratamiento específico, asimetrías y oclusión vascular arterial que requeriría la inmediata inyección de hialuronidasa.

A largo plazo resultado insuficiente o excesivo, reacción inmunológica, nódulos granulomas necrosis inflamación periódica de la piel de los labios, alteraciones de la pigmentación transitorias o permanentes e infecciones diferidas también otros riesgos debido a la anestesia tópica o local.

## Contraindicaciones

Estará contraindicado su uso en pacientes alérgicos al ácido hialurónico, o a sus excipientes, en infecciones activas de la zona a tratar, en diabetes descompensada, en enfermedades autoinmunes, o con terapia inmunológica, en pacientes que siguen tratamientos inmunosupresores, en antecedentes de mala cicatrización, en pacientes con antecedentes de infiltración permanente en la misma zona a tratar, en embarazo y lactancia, y en menores de 18 años.